

hpv disease
cervical
genital
medical
health
vaccine
sexually
cervix
papilloma
protection test
vaccination
prevention
pathology
therapy
education
cancer
uterus
gynecology
malignant
tumor
campaign
vaginal
injection
transmitted
biology
immunisation
healthy
prevent
anatomy
diagnosti
cell
women
bacteria

آلودگی به HPV و زگیل تناسلی در مردان

خوشبختانه در اکثر موارد توسط سیستم دفاعی بدن مهار می شود ولی چنانچه این پدیده اتفاق نیفتد ممکن است ضایعات پوستی به شکل زگیل روی آلت، خال های گوشتی با شکل ها و رنگ های مختلف روی آلت تناسلی، خال های گوشتی یا زگیل روی کشاله ران و زیر ناف یا زیر شکم ایجاد گردد.

چنانچه زگیل تناسلی در مردان باقی بماند فرد را در معرض برخی از سرطان ها نظیر سرطان آلت از نوع SCC، سرطان مقعد یا سرطان های حلق و دهان قرار می دهد.

آلودگی به HPV و زگیل تناسلی در بانوان

سرطان دهانه رحم، سومین عامل مرگ و میر در جهان می باشد به گونه ای که در هر دو دقیقه یک زن در اثر این بیماری جان خود را از دست می دهد. تحقیقات نشان می دهد که این تغییرات می توانند پیش سرطانی باشند و به مرور زمان به سرطان تبدیل شوند. اگر سلول های پیش سرطانی به سلول های سرطانی تبدیل شوند و عمیق تر به دهانه رحم با دیگر بافت ها و یا اندام ها پخش شوند بیماری سرطان دهانه رحم نامیده می شود.

همانگونه که اشاره شد ویروس HPV بیش از یکصد نوع دارد که برخی از انواع آن نظیر سروتیپ های ۱۶، ۱۸، ۳۱، ۳۴، ۳۳، ۳۵، ۳۹، ۴۲، ۴۴، ۴۵، ۵۱، ۵۲، ۵۶، ۵۸، ۶۶ با ریسک بالا بوده و شانس سرطان بسیار بالا است. از این بین سروتیپ های ۱۶ و ۱۸ شایعترین سروتیپ ها است.

سروتیپ های ۶، ۱۱، ۴۳، ۷۴ شانس سرطان زائی کم بوده که از این بین شایعترین سروتیپ ها سروتیپ های ۶ و ۱۱ می باشد.

در موارد آلودگی با سروتیپ های HPV با ریسک بالا فرد در معرض سرطان آلت تناسلی و سرطان مقعد و سایر سرطان های دهان و حلق می باشد و دوره ی نهان بیماری در سویه های پر خطر می تواند تا مدت ۱۵ سال ادامه یابد.

اقدام جهت پیشگیری از سرطان دهانه رحم

با انجام منظم آزمایش تشخیصی HPV برای شناسایی و درمان زود هنگام تغییرات پیش سرطانی می توان اقدام نمود.

تست غربالگری HPV

در این تست بررسی کلیه ژنوتایپ های این ویروس انجام می شود که نوع نمونه نیز همانند نمونه گیری پاپ اسمیر از طریق برداشت سلول ها به وسیله براش و انتقال آن به مایع لیکوئید می باشد.

برای انجام تست پاپ اسمیر و HPV باید یک تا دو هفته بعد از دوره عادت ماهانه (بعد از خونریزی) به پزشک متخصص زنان مراجعه کرد.

● افرادی که قصد دارند تست پاپ اسمیر انجام بدهند نباید ۲۴ ساعت قبل از انجام این تست رابطه زناشویی داشته باشند.

● اگر فردی از دوش واژینال (شست و شوی داخلی) استفاده می کند باید از ۴۸ ساعت قبل انجام این کار را متوقف کند.

● همچنین کرم های واژینال نیز نباید از ۴۸ ساعت قبل از انجام پاپ اسمیر، استفاده شوند.

● خیلی از افراد تصور می کنند که برای انجام پاپ اسمیر باید ناشتا باشند در حالی که برای انجام این تست نباید ناشتا بود چون تست پاپ اسمیر از طریق خون گیری نیست.

واکسن گارداسیل چیست ؟

آن دسته از افرادی که از واکسن زگیل تناسلی استفاده می کنند نباید تصور کنند که تا آخر عمر از ابتلا به زگیل تناسلی و سرطان مصون هستند، چون تحقیقات روی این واکسن هنوز ادامه دارد و دقیقاً مشخص نیست که این واکسن تا چه مدت می تواند بدن را در برابر ویروس مصون نگه دارد.

گارداسیل یک آمپول است که برای خانم ها و دختران ۹ تا ۲۶ سال استفاده می شود تا علیه بیماری های زیر که توسط ویروس پاپیلومای انسانی ایجاد می شوند حفاظت شوند:

- سرطان رحم
- زگیل های تناسلی
- سرطان های واژن و فرج
- سرطان مقعد
- ضایعات پیش سرطانی مقعد، دهانه رحم و واژن

در مورد آقایان نیز واکسن گارداسیل می تواند مانع بروز مشکلات زیر شود:

- سرطان مقعد
- زگیل های تناسلی
- ضایعات پیش سرطانی مقعدی

چگونه گارداسیل تجویز می شود ؟

گارداسیل آمپولی است که معمولا در عضله بازو تزریق می گردد. این آمپول به ۳ دوز و طبق برنامه ای تجویز می شود:

- دوز اول: در تاریخی که شما و پزشکتان تصمیم بگیرید
- دوز دوم: دو ماه پس از تزریق دوز اول
- دوز سوم: شش ماه بعد از تزریق دوز اول

مواردی که در رابطه با گارداسیل باید بدانید

این آمپول تنها علیه بیماری های ایجاد شده توسط ویروس های نوع ۶، ۱۱، ۱۶، ۱۸ محافظت ایجاد می کند. این آمپول عفونت ایجاد شده را درمان نمی کند. با تزریق این آمپول به فرد به بیماری های ذکر شده در بالا مبتلا نمی شود.

چه کسانی نباید از این واکسن استفاده کنند ؟

افرادی که پس از یک دوز دریافت، حساسیت نشان داده اند.
افرادی که به سولفات آمورف آلومینیوم، پلی سوربات ۸۰ یا انواع مخمرها حساسیت شدید دارند.

هشدار: ممکن است از حال رفتن یا غش بعد از تزریق هر واکسن به خصوص در نوجوانان دیده شود.
به این دلیل توصیه می شود بعد از تزریق فرد به مدت ۱۵ دقیقه دراز بکشد.
همچنین در دوره واکسیناسیون استفاده از این آمپول مجاز نمی باشد.

Connect with us



آزمایشگاه ژنتیک و پاتوبیولوژی مندل



www.mendellab.ir



info@mendellab.ir



[mendel_genetic_lab](https://www.instagram.com/mendel_genetic_lab)



[irangenetic](https://www.t.me/irangenetic)



۸۸۱۹۸۰۷۷ (خط ۵)



خیابان ولیعصر، ابتدای توانیر، ساختمان پزشکان
شماره ۴، طبقه اول واحد ۵